神经胶质细胞转分化为神经元的研究进展

赵晓初¹⁾ 罗兆莉²⁾ 杨菲³⁾ 李纤^{2)*}

¹⁾ 首都医科大学基础医学院, 北京 100069; ²⁾ 首都医科大学基础医学院生物化学与分子生物学学系, 北京 100069;

³⁾ 首都医科大学基础医学院神经生物学学系, 北京 100069)

摘要 细胞转分化是通过基因重编程, 诱导某种细胞直接转变为另一种细胞, 而不经其他中间状态的过程。神经元丢失是神经系统疾病中常见的病理过程, 神经元丢失通常不可逆转, 且造成运动、感觉、精神症状。而由于人中枢神经系统神经元再生能力十分有限, 仅有部分区域在神经损伤的刺激下能够新生少量神经元。在这样的背景下, 将神经胶质细胞(星形胶质细胞、小胶质细胞和少突胶质前体细胞)在神经元丢失处原位转分化为功能性神经元并整合进神经网络的治疗性策略, 受到了广泛关注。近年来, 学者通过在神经胶质细胞中将神经元命运决定的重要转录因子过表达或敲减等手段, 成功实现其向神经元的转分化, 取得多项重大进展, 但由于目前研究手段的局限性、判断标准的分歧性、结果和结论间较难自洽等问题, 部分研究成果的结论仍存在很大的争议。本文系统地回顾了神经胶质细胞转分化为神经元的发现与发展历程, 总结了神经胶质细胞转分化为神经元的重要发现, 并进行讨论与展望。

关键词 神经胶质细胞, 神经元, 转分化, 神经再生, 神经修复

中图分类号 Q189

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0459

神经元(neuron)在胚胎发育中由神经祖细胞(neuroepithelial cells, NEs)经过神经元发生相转变为放射状胶质细胞(radial glial cells, RGs), 通过不对称分裂直接产生, 也有一些神经元通过中间祖细胞(neural progenitors, NPs)间接分化产生^[1]。出生后, 中枢神经系统(central nervous system, CNS)中的神经元再生能力十分匮乏, 仅侧脑室(lateral ventricle)的室管膜下区(subventricular zone, SVZ)和海马齿状回(dentate gyrus, DG)的颗粒下区(subgranular zone, SGZ)等几处保留少量来自放射状胶质细胞系的胶质源性纤维酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein, GFAP)阳性细胞, 在内源性条件与外源性因素的共同作用下, 缓慢生发少量神经元, 迁移至所需位置并整合入神经网络发挥功能^[2]。

在神经系统疾病中, 不可逆的神经元丢失是疾病发生发展过程中一个关键且共有的环节。帕金森病(Parkinson's disease, PD)患者出现运动障碍/运动迟缓、震颤、僵硬和姿势不稳等运动症状, 主要源自于黑质致密部中的多巴胺(dopamine, DA)

能神经元的丢失^[3]; 阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)患者不同大脑区域中都能观测到神经元数量的减少, 且海马CA1区和内嗅皮质中神经元的丢失与记忆缺陷的严重程度呈正相关^[4]; 在脑卒中(stroke)发生后, 每晚1 min得到救治, 患者神经系统就丢失1.8亿个神经元^[5], 从而导致不可逆的感觉缺失、运动障碍和精神后遗症等。因此, 寻找能够进行神经元补充、神经网络整合和功能恢复的科学手段, 对神经系统疾病的临床改善是十分迫切且必要的。

中枢神经系统的固有细胞主要包括神经元、神经胶质细胞(glia)以及巨噬细胞等^[6]。神经胶质细胞在神经组织中数量庞大、功能复杂, 人脑中胶质细胞的数量占人类全部中枢神经系统细胞的90%^[7]。位于中枢神经系统的神经胶质细胞主要包括星形胶质细胞(astrocytes)、少突胶质细胞(oligodendrocytes)和小胶质细胞(microglia)等。

* 通讯联系人。

Tel: 010-83950515, E-mail: qianli@ccmu.edu.cn

收稿日期: 2022-09-24, 接受日期: 2022-10-11

小胶质细胞产生于胚胎时期的卵黄囊并迁入中枢神经系统^[8]，其他的神经胶质细胞与神经元均起源于神经外胚层（neuroectoderm）^[7]（图1）。在胚胎神经发生过程中，RGs在神经发生后期向胶质细胞发生相转变，主要生成星形胶质细胞和少突胶质细胞^[1, 9]。其中，星形胶质细胞是脑内最丰富的细胞群之一，约占中枢神经系统细胞总数的50%^[10]。在健康的中枢神经系统中，星形胶质细胞参与突触的形成，去除细胞外液中多余的神经递质以实现神经信号的精准传递，并通过与神经元的双向交流来调节突触与神经系统功能、行为和信处理；还能够通过调节局部血流增减葡萄糖与氧气供应，并为神经元提供葡萄糖或乳酸等作为能量底物^[7, 11]。少突胶质细胞由RGs经少突胶质前体细胞（oligodendrocyte progenitor cells, OPCs or NG2 cells）分化而来^[12]，在中枢神经系统不同部位占比不同。其在脊髓背侧柱中占总细胞数的37%~

42%，其中脊髓灰质后角占13%~16%，但在大脑皮层和海马灰质仅占4%~5%^[13]。少突胶质细胞能够包裹轴突，在维持轴突的完整、提供支持并缓冲等保护、辅助神经元沿轴突快速有效地进行电信号传导中发挥关键作用，并通过自身糖代谢为神经元轴突提供诸如葡萄糖、乳酸和糖酵解产物等能量底物，支持其电活动^[14]。小胶质细胞属于单核细胞系统，约占中枢神经系统细胞总数的5%~10%^[15]。小胶质细胞是中枢神经系统内再生能力最强的胶质细胞，在合适条件下可达每日新增20%的增殖速度^[16-17]，在中枢神经系统中清除碎片和吞噬细胞、维持神经系统稳态^[18]，并为其他中枢神经系统细胞的发育等提供支持^[16]。总的来说，由于神经胶质细胞数量众多，易于增殖，与神经元空间位置相近，这为神经胶质细胞向神经元的转分化提供了得天独厚的条件。

Fig. 1 The development of neuronal and glial cells in the central nervous system

图1 中枢神经系统神经元与神经胶质细胞发育过程

神经元与除小胶质细胞外的神经胶质细胞均起源于神经外胚层。神经祖细胞经过神经元发生相转变为放射状胶质细胞。神经元可能由放射状胶质细胞不对称分裂产生，也可能通过中间祖细胞间接分化产生。放射状胶质细胞在神经发生后期转变为胶质细胞发生相，星形胶质细胞由放射状胶质细胞分化而来，少突胶质细胞由放射状胶质细胞分裂产生的少突胶质前体细胞（OPCs，或称NG2胶质细胞）发育而来，而小胶质细胞则来源于胚胎时期的卵黄囊产生的单核细胞，迁入中枢神经系统。图制于BioRender.com。

为改善神经元丢失这一病理进程, 学者们尝试将非神经元细胞在一定条件下诱导为具有以下特征的神经元: 具备胞体、轴突与树突的神经元基本形态; 表达 Tuj1、MAP2、NeuN、Synapsin 等神经元标志物; 具有神经元极化特点; 表面表达有功能的膜通道蛋白 (如电压门控 Na⁺通道) 和能够被激活的神经递质受体 (如谷氨酸受体); 具备静息电位、动作电位等神经元电生理特性; 具有形态 (包含突触小泡等结构) 和功能 (具有自发的突触后电流) 完整性, 能够整合进入神经网络并在撤除诱导因素后仍保持神经元特性的稳定^[19]。如前所述, 神经胶质细胞与神经元位置相近、谱系相同, 因而胶质细胞-神经元转分化以其原位、直接等优点, 成为逆转神经元丢失的潜在有效手段^[20], 因而作为这一领域中的热点问题之一, 受到了广泛的关注与期待。

所谓转分化 (cellular conversion), 指通过各种手段对细胞进行基因重编程, 使某种细胞跳过诱导多能干细胞状态, 直接转变为另一种细胞并表达其特征的过程^[21]。如能成功实现神经胶质细胞向神经元的转分化, 并整合入神经网络, 则中枢神经系统疾病病理过程中的神经元丢失就可能得到逆转, 神经系统功能就可能得到改善, 神经系统疾病的临床治疗可能因此产生新的希望。

1 星形胶质细胞-神经元转分化的研究进展

中枢神经损伤后, 受损处原本处于静止状态的星形胶质细胞被表皮生长因子 (epidermal growth factor, EGF)、纤维生长因子 (fibroblast growth factor, FGF)、内皮素 1 (endothelin 1) 和三磷酸腺苷 (adenosine triphosphate, ATP) 等激活为反应性星形胶质细胞 (reactivated astrocytes), 并重新进入细胞周期增殖增生^[22-23]。反应性星形胶质细胞因所受刺激不同, 能够通过不同信号通路改变自身功能并影响其他细胞, 导致神经功能障碍^[23]。此外, 星形胶质细胞长时程激活会形成难以降解的胶质瘢痕 (glial scar), 虽然限制了神经炎症的扩散, 但其在神经损伤修复的过程中会通过多种复杂的信号级联反应产生细胞毒性分子, 抑制突触与髓鞘的再生、对附近的神经通路造成长期负面影响, 导致慢性炎症或神经性疼痛^[23]。由于其在刺激下能够增殖甚至去分化并获得部分神经干细胞的特性^[24-25], 星形胶质细胞作为可能向神经元转分化的一种理想原料成为研究者的关注对象。另一方

面, 将星形胶质细胞转分化为神经元可能减少胶质瘢痕对神经修复的长期负面影响, 可能为神经损伤后的修复带来积极影响。

研究者们首先将目光聚集在体内自然状态下的神经发生过程中、对细胞命运改变起到关键作用的转录因子上, 诸如配对框基因 6 (paired-box 6, Pax6)^[26]、少突胶质细胞转录因子 2 (oligodendrocyte lineage transcription factor 2, Olig2)^[27]、原神经基因 2 (neurogenin 2, Ngn2)^[28]、神经母细胞特异性转移因子 1 (achaete-scute homolog 1, Ascl1)^[29]、无远端同源盒 2 (distal-less homeobox 2, Dlx2)^[30]、神经分化因子 1 (neurogenic differentiation 1, NeuroD1)^[31] 等, 希望通过对其转录活性进行操纵, 以达到胶质细胞转分化为神经元的目的 (图 2)。

2002 年, 德国马克斯·普朗克研究所 Magdalena Götz 教授课题组首次发现, 如果使用包含 Pax6 cDNA 的逆转录病毒, 感染出生后 5~11 d 分离培养的小鼠皮层 Pax6⁺ 的星形胶质细胞, 则能够成功诱导其转分化为具有神经元胞体与突起的形态、表达 Tuj1 和 NeuN 等标志物、并对谷氨酸和 γ -氨基丁酸 (γ -amino butyric acid, GABA) 有反应的神经元^[26]。经该团队探索, Pax6 在自然状态中是一种在发育的皮层 RGs 中表达的神经元命运因子^[32], 在小鼠胚胎皮层中能够通过上调 Ngn2、下调 Ascl1 促进神经元命运的决定^[26], 在星形胶质细胞^[26]与反应性星形胶质细胞^[26]中亦能够诱导表达部分早中期神经元发育标志物, 而这些神经元是否具有功能仍待探索^[27]。在成年体内神经发生中, Olig2 是一种与 Pax6 相互拮抗的转录因子^[33], 且 Olig2 基因和原神经基因的不同组合对神经外胚层谱系向神经元、少突胶质细胞或星形胶质细胞的发育有决定性意义^[34]。在局部缺血和 AD 模型小鼠皮质内, 使用能够拮抗内源性 Olig2 功能的逆转录病毒感染反应性星形胶质细胞, 可以将其转分化为表达双皮质素 (doublecortin, DCX) 的未成熟神经元^[27]。接着, Götz 教授团队又使用编码 GFP、Ngn2-IRES-GFP 或 Ascl1-IRES-GFP 的 VSV-G 假性逆转录病毒感染从出生后 5~7 d 小鼠的大脑皮层中分离培养的星形胶质细胞, 成功将其转分化为具有基本神经元形态特征、GFP 与 Tuj1 双阳性、能够接受输入性刺激并可产生电活动的突触后神经元^[35], 通过膜片钳等电生理手段对转分化而来的神经元的膜电位、突触活动进行检测, 通过免疫荧

光染色检测能够代表神经元功能活性的标志物 Tuj1, 首次验证了星形胶质细胞能够转分化为具备神经元电生理特性的、有功能的神经元, 并提出了不同转录因子诱导星形胶质细胞向不同神经元亚型转分化的可能性。随后学者们陆续发现, 应用逆转录病毒转染从出生后早期 (2~7 d) 的小鼠皮层中分离培养的星形胶质细胞, 过表达 Ngn2 可通过上调 T 盒脑 1 (T-box brain 1, Tbr1) 诱导谷氨酸能神经元的产生^[36], 同时过表达 Dlx2 和 Ascl1 诱导 GABA 能神经元的产生^[36], 而同时过表达 Ascl1、LIM 同源框转录因子 1 (LIM homeobox transcription factor 1 beta, Lmx1b) 或核受体相关因子 1 (nuclear receptor related factor 1, Nurr1), 则使星形胶质细胞转分化为 DA 能神经元^[37]。更重要的是, 通过适当的表达神经外胚层谱系细胞向神经元分化的命运决定因子能够诱导出具备功能性突触前输出、能自发形成神经网络的诱导神经元^[36], 解决了转分化神经元无法整合进入神经网络的问题^[35]。此外, 胶质细胞转分化为神经元的效率也从原本的较为低下^[26, 35], 通过一定比例转录因子的搭配提高到了较高的水平^[37]。

在过表达神经元命运决定相关转录因子介导的星形胶质细胞-神经元转分化中, NeuroD1 引起了最为广泛的关注。NeuroD1 是一种具有基本螺旋-环-螺旋 (basic helix-loop-helix, bHLH) 结构域的转录因子, 仅在胰岛、肠内分泌细胞、胃与神经元、神经干细胞中表达^[38-39], 对诸如腺苷酸激酶同工酶 1 (adenylate kinase isozyme 1, AK1)、肌醇 1,4,5-三磷酸受体 1 (inositol 1,4,5-triphosphate receptor 1, IP3R1)、早期 B 细胞因子 3 (early B-cell factor 3, Ebf3) 和 POU 结构域转录因子脑 3d (brain 3d, Brn3d) 等神经分化有关基因的转录激活十分重要^[40], 在胚胎神经发生 (尤其是海马和小脑中颗粒细胞的生成^[41]) 以及成年神经发生、成熟和存活中均起到决定性作用^[42], 并能诱导神经元的终末分化^[43]。通过向 1~14 个月龄的小鼠脑内立体定位注射 VSV-G 假型逆转录病毒, 在小鼠脑内星形胶质细胞中过表达 NeuroD1, 在脑外伤、AD 模型小鼠皮质中星形胶质细胞转分化为功能性谷氨酸能神经元^[44], 首次完成了体内星形胶质细胞向神经元的转分化^[44]。这些新生神经元能够整合入局部神经环路, 修复神经元丢失造成的功能丧失^[44]。而后, 有学者发现, 利用腺相关病毒 9 (adeno-associated virus 9, AAV9) 穿过血脑屏障,

在纹状体等部的非反应性星形胶质细胞中过表达 NeuroD1, 在生理状态下也能够成功将其转化为神经元^[45]。以上成果为过表达 NeuroD1 诱导星形胶质细胞-神经元转分化提供了基础, 使学者们开始尝试将 NeuroD1 应用于更多疾病模型与临床转化 (表 1)。针对神经元丢失导致的中枢神经系统疾病, 陈功教授团队使用 AAV 在缺血性脑卒中小鼠与猴的皮质中实现了过表达 NeuroD1, 成功将星形胶质细胞转分化为神经元^[39, 46]; 在亨廷顿舞蹈症 (Huntington's disease, HD) 模型小鼠纹状体中, 实现了同时过表达 NeuroD1 和 Dlx2 将星形胶质细胞转分化为神经元^[47]; 在脊髓挫伤、刺伤 (stab wound lesion) 小鼠模型脊髓背角中实现了过表达 NeuroD1 或同时过表达 NeuroD1 和 Dlx2, 将星形胶质细胞转分化为脊髓神经元亚型, 并能整合入脊髓神经环路中^[48]。针对以神经元过度兴奋和突然同步放电为特征的癫痫^[49], 陈功教授团队成功运用基于 NeuroD1 过表达的胶质细胞-神经元转分化的神经再生型基因疗法, 将颞叶癫痫模型大鼠的海马脑区的星形胶质细胞原位转分化为抑制性中间神经元, 有效地降低了癫痫发作, 为难治性颞叶癫痫的治疗带来了新希望^[50]。针对星形胶质细胞来源的恶性胶质母细胞瘤 (glioblastoma, GBM), 陈功教授团队通过 NeuroD1 在体外将人胶质母细胞瘤细胞转分化为 VGlut3⁺ 的谷氨酸能神经元, 为胶质母细胞瘤的治疗提供了新的可能^[51]。

众多研究结果展现了通过过表达 NeuroD1 操纵星形胶质细胞命运, 使其高效转分化为神经元的可能性, 以及这一手段在临床应用中的巨大潜在前景。然而近期, 过表达 NeuroD1 诱导星形胶质细胞-神经元转分化的可能性受到了质疑与广泛讨论。德州州立大学西南医学中心张春立教授认为, 由于基因编辑技术的缺陷, 仅仅依据病毒表达的荧光报告基因 (例如 GFP 或 mCherry) 作为判定新生神经元来源, 并不能作为转分化的金标准: AAV 病毒携带的基因可能串联或重组, 导致 NeuroD1 序列对于荧光报告基因原本应有的顺式调节作用变成一种类似于反式调节作用, 导致荧光报告基因的异常表达^[52]; 同时由于 AAV、慢病毒会发生泄漏, 因此报告基因能够表达在原位神经元中, 而非被基因编辑的星形胶质细胞中^[52]。张春立教授团队还通过谱系追踪法等多种手段证明, “转分化的神经元”在谱系追踪中无法追溯至过表达 NeuroD1 的星形胶质细胞, 而是来源于本就存在的原位神经元^[53]。

Table 1 Results of neuroregenerative therapy based on overexpression of NeuroD1 in disease models

表1 基于过表达NeuroD1的神经再生疗法在疾病模型中的研究成果

动物模型	疾病模型	处理手段	起始状态	终末状态	功能改善
小鼠 (5~12个月) 和大鼠 (3~5个月, 用于认知测试)	缺血性卒中 ^[39]	AAV NeuroD1 Cre FLEX系统立体定位注射	皮层GFAP ⁺ 反应 星形胶质细胞	NeuN、MAP2等阳性、具有清晰树突、有髓轴突的神经元, 其中多数为皮质椎体神经元	全转录组恢复, 修复皮质组织, 整合入神经网络, 建立投射, 改善行为与认知功能
恒河猴 (9~21岁, 雄性)	缺血性卒中 ^[46]	AAV NeuroD1 Cre FLEX系统立体定位注射	皮层GFAP ⁺ 反应 星形胶质细胞	NeuN、MAP2等阳性, 具有清晰轴突的皮质神经元	修复皮质组织, 保护小胶质细胞与小清蛋白阳性的GABA能神经元
小鼠 (2~5个月)	亨廷顿舞蹈症 ^[47]	AAV Cre FLEX系统 立体定位注射, 同时过表达NeuroD1与Dlx2	纹状体GFAP ⁺ 星形胶质细胞	NeuN ⁺ 、具备功能活性的神经元, 其中一半以上为GABA能中等棘神经元 (medium spiny neurons, MSN)	整合入神经网络, 建立投射, 缓解神经变性与纹状体萎缩, 改善运动功能并延长生命
小鼠 (2~4个月)	脊髓挫伤 ^[48]	AAV NeuroD1 Cre FLEX系统立体定位注射	脊髓背角GFAP ⁺ 星形胶质细胞	NeuN等阳性、具备神经元形态的脊髓神经元, 具备功能活性, 其中大部分为Tlx3 ⁺ 谷氨酸能神经元	-
大鼠 (190~240 g)	癫痫 ^[50]	AAV NeuroD1立体定位注射	海马CA1区 GFAP ⁺ 星形胶质细胞	NeuN等阳性、具备功能活性的神经元, 其中80%为GABA能神经元	整合入神经网络, 补充神经元丢失, 降低癫痫的发作频率, 改善行为异常, 提升存活率

面对质疑, 陈功教授团队通过转录组测序 (RNA-sequencing) 等手段发现 NeuroD1 在星形胶质细胞向神经元转分化的过程中发挥出强大的驱动力, 并触发了快速的转录组学变化^[54]。同时他们利用双光子活体成像展示了星形胶质细胞 (包括谱系追踪胶质细胞) 逐步转化为神经元的过程, 并发现 NeuroD1 在不同脑区中诱导转分化形成不同类型的神经元, 再次验证了过表达 NeuroD1 可以诱导星形胶质细胞向神经元转分化的结论^[55]。陈功教授认为, 张春立教授团队未能成功将星形胶质细胞转分化为神经元有多种可能原因, 包括: a. AAV 滴度超过安全剂量导致神经元泄漏与胶质细胞损伤; b. 转分化现象观察窗口期过短导致现象未出现; c. NeuroD1 表达量不足以克服 tdTomato 标记的星形胶质细胞的转分化阻力等^[56]。目前, 尽管通过过表达 NeuroD1 诱导星形胶质细胞向神经元转分化这一手段表现出令人期待的潜力, 但 NeuroD1 过表达能否使星形胶质细胞向神经元转分化的问题仍在探讨, 且 NeuroD1 如何介导星形胶质细胞-神经元转分化的分子机制也未被明确解答, 再加上 AAV、慢病毒、逆转录病毒的使用可能导致一系列临床安全问题, NeuroD1 距离真正应用于临床仍然道阻且长。

不同于上述将神经元命运决定相关转录因子上

调的“加法”策略, “减法”策略旨在通过非神经元细胞中敲低在神经分化过程中自然下调的关键抑制性转录因子来诱导生成神经元。“减法”策略中备受关注的转录因子是多嘧啶区结合蛋白 (recombinant polypyrimidine tract binding protein, Ptbp)。Ptbp 是一类核糖核酸 (ribonucleic acid, RNA) 聚嘧啶区结合蛋白, 在哺乳动物中包括 Ptbp1~3 三个成员。其中 Ptbp1 在哺乳动物除神经元外的大多数组织细胞中表达, 能够调节可变剪接、信使 RNA (messenger RNA, mRNA) 翻译与 mRNA 稳定性等, 从而维持神经元基因主要抑制因子的活性, 抑制细胞向神经元分化的倾向^[57]。敲减 Ptbp1 是将成纤维细胞转分化为神经元的充分且必要的条件^[58], 利用小发夹 RNA (short hairpin RNA, shRNA) 在星形胶质细胞中敲减 Ptbp1, 也能够将其转分化为功能性神经元, 并可在 PD 小鼠模型中诱导产生新的有功能的 DA 能神经元、重建受损神经环路、恢复纹状体多巴胺水平, 并有效挽救 DA 能神经元损失, 减轻 PD 小鼠模型的运动功能障碍^[59-60], 在老年小鼠中也完成了神经元的转分化和功能整合^[61]。使用 CRISPR-CasRx 系统将 Müller 胶质细胞中的 Ptbp1 基因敲减, 也被证明在完整和受损的成熟视网膜中将胶质细胞在体转分化为视网膜神经节细胞, 并建立中央投射, 在药物性

视网膜损伤的小鼠模型中部分恢复了视觉功能^[60]。这些研究为胶质细胞转分化为神经元提供了新的思路、手段与证据，为PD及其他神经退行性疾病提供了极具前景的治疗策略和方法。

针对Ptbp1，许多团队亦发文表示需要重新审视通过敲减Ptbp1诱导星形胶质细胞转分化的可能。在两种谱系小鼠皮层中运用CRISPR-CasRx进行敲减时，未观测到内源Ptbp1表达量的明显降低，也没有在谱系追踪时观察到胶质细胞转分化为神经元的现象^[53]；使用shRNA进行敲减时，虽然观测到内源Ptbp1敲减，但未观测到谱系标记的星形胶质细胞转分化为神经元^[53]；通过CRISPR-CasRx或shRNA敲减Ptbp1都无法将Müller胶质细胞转分化为视网膜神经节细胞^[62]；星形胶质细胞特异性谱系追踪下通过shRNA和反义寡核苷酸(antisense oligonucleotide, ASO)敲减Ptbp1均无法在生理或PD病理状态下，将星形胶质细胞直接转分化为DA能神经元并改善小鼠运动障碍^[63]；利用遗传谱系示踪和单细胞测序谱系追踪，通过传统基因编辑方法进行Ptbp1敲除，同样未能观测到视网膜Müller胶质细胞或皮层、纹状体的星形胶质细胞向神经元转分化^[64]。约翰·霍普金斯大学Seth Blackshaw教授认为，之前研究成果中观察到的失明小鼠的视觉恢复和PD小鼠的行为恢复可能是特异性启动子GFAP在内源性神经元中的异位表达或在Ptbp1的脱靶效应所致^[65]。针对Ptbp1的讨论仍在继续，尽管质疑声频起，但Ptbp1在胚胎发育的过程中的确对神经分化表现出十分有力的抑制作用^[66]，故而敲减Ptbp1诱导星形胶质细胞向神经元转分化具备一定的理论可行性，此后的实验中应秉持更加审慎的态度持续探究与探讨。

2 小胶质细胞-神经元转分化的研究进展

尽管星形胶质细胞数量多，且与神经元同为神经外胚层谱系的成员，但其再生能力相对较弱^[67]。相较而言，小胶质细胞是分布在整个中枢神经系统的常驻免疫细胞，再生能力十分强大，且脑外伤、脑卒中、神经退行性疾病等病理改变均能够引起其大量的激活和增殖^[68]。另外，小胶质细胞的消除基本不会在健康成年小鼠引起明显的副作用，反而能在病理状态下一定程度上通过减轻小胶质细胞引起的炎症而缓解中枢神经系统疾病的病理改变^[68]。因此，近两年学者们将目光投向了小胶质细胞，对其是否具备转分化为神经元的潜能进行了研究和

探讨。

2019年，九州大学Nakashima团队实现了通过慢病毒在小胶质细胞内过表达NeuroD1，在体外、体内都成功诱导了小鼠小胶质细胞转分化为表达Tuj1与MAP2ab等神经元标志物，有神经元基本特性且与原代神经元基因表达谱一致的神经元^[69](图2)。在转分化成功的神经元中，VGLUT1⁺的谷氨酸能神经元占比约75%，GAD67⁺的GABA能神经元占比约25%^[69]。在分子层面，NeuroD1的过表达能够通过调节组蛋白修饰与DNA甲基化水平，通过表观遗传调控神经元转录激活Scrt1与Meis3两种转录因子，再通过转录抑制Mafk与Lyl1两种小胶质细胞免疫相关基因，加速小胶质细胞特性的消失^[69]。这一研究首次提出了小胶质细胞转分化为神经元的可能，使神经原位再生与细胞替代疗法有了新的潜在选择，具有较高的临床价值与转化意义。

然而也有观点认为，小胶质细胞属于单核细胞系，由胚胎早期卵黄囊髓系祖细胞分化产生^[8]，而神经元属于神经外胚层谱系，由RGs分化产生^[70]，与小胶质细胞发育谱系差别较大，小胶质细胞不具备向神经元转分化的理论可行性^[68]：包括NeuroD1在内的转分化诱导因子均在神经外胚层谱系RGs分化的过程中参与决定细胞的命运^[42]，并不表达在小胶质细胞所在的髓系谱系中，所以髓系谱系中不一定存在支撑神经外胚层谱系细胞命运决定的下游元件。2021年，有研究通过谱系追踪和活细胞成像等技术发现，使用慢病毒过表达NeuroD1，无法诱导小胶质细胞转分化为神经元，反而表达NeuroD1的小胶质细胞发生大规模死亡^[68]。这也印证了之前陈功教授团队亦无法通过NeuroD1诱导小胶质细胞向神经元转分化的结果^[44]。针对NeuroD1能否诱导小胶质细胞转分化的讨论仍在继续，如若成功，小胶质细胞向神经元的转分化这一手段的临床应用前景巨大。

3 NG2胶质细胞与少突胶质细胞-神经元转分化的研究进展

少突胶质前体细胞(OPCs,也称为NG2胶质细胞)，作为成年哺乳动物中枢神经系统中最常见的祖细胞，终身具备增殖分化的能力，能够随时重新激活增殖，或分化为少突胶质细胞或星形胶质细胞^[71]。相较星形胶质细胞，NG2胶质细胞具备卓越的增殖分化能力，可能成为源源不断的原料；而

相较小胶质细胞, NG2 胶质细胞与神经元谱系一致, 向神经元转分化的可行性更高。因此, NG2 胶质细胞走入神经再生领域学者的视野, 成为诱导向神经元转分化的优良候选对象 (图2)。

学者们同样希望通过特异性高表达神经元的转录因子或拮抗 NG2 胶质细胞中抑制神经元命运的转录因子, 诱导 NG2 胶质细胞转分化为神经元。性别决定区 Y 盒蛋白 2 (sex-determining region Y-box2, Sox2) 在神经发育中, 对神经干细胞特性的维持及神经元亚型的分化中起重要作用 [72]。在刺伤后的小鼠大脑皮质中利用逆转录病毒单独过表达 Sox2 或同时过表达 Sox2 与 Ascl1, 可诱导 NG2 胶质细胞转分化为 DCX⁺ 的神经元 [73]。随后, Sox2 的上调也被发现能在脊髓损伤中诱导 NG2 胶质细胞重编程为神经元, 并促进新生神经元与神经通路形成突触连接与脊髓损伤后的功能恢复 [74]。此外, 在成年小鼠纹状体 NG2 胶质细胞中利用慢病毒同

时过表达 Ascl1、Lmx1a 和 Nurr1, 能够将其转分化为 GABA 能和谷氨酸能神经元, 并长时间保持稳定的功能性神经元电生理特性 [75]。

在星形胶质细胞与小胶质细胞中争议颇多的 NeuroD1 与 Ptpb1 两种因子, 也在 NG2 胶质细胞与少突胶质细胞的转分化中受到关注。通过过表达 NeuroD1, 可以将体外培养的小鼠皮层 NG2 胶质细胞和脑外伤小鼠的皮层 NG2 胶质细胞, 转分化为有功能的谷氨酸能和 GABA 能神经元 [44]; 通过慢病毒转染体外培养的小鼠皮层少突胶质细胞过表达 NeuroD1, 也能将其转分化为 NeuN 和 MAP2ab 双阳性的神经元 [69]。在小鼠纹状体少突胶质细胞中敲减 Ptpb1, 成功诱导其转分化为表现出正常电生理特性的成熟神经元 [76]。目前, NG2 胶质细胞/少突胶质细胞-神经元转分化似乎已成为胶质细胞-神经元转分化中争议最少的部分, 未来可能为中枢神经系统疾病, 尤其是脊髓相关疾病带来新的希望。

Fig. 2 Glial cell-neuron conversion
图2 胶质细胞-神经元的转分化

在中枢神经系统中, 星形胶质细胞、小胶质细胞、NG2胶质细胞和少突胶质细胞均被发现能够在某些转录因子过表达或低表达的情况下转分化为表达NeuN、Tuj1、MAP2等标志物且表现出正常神经元电生理活性的神经元。不同转录因子能够诱导不同亚型神经元的产生, 其中蓝色标记的转录因子诱导形成谷氨酸能神经元, 绿色的诱导形成DA能神经元, 黄色代表诱导形成GABA能神经元, 多种颜色标记的能够诱导形成多种亚型, 灰色标记的目前未知; ↑为过表达, ↓为敲减。图制于BioRender.com。

4 讨论与展望

使用干细胞重编程 (reprogramming) 为神经元, 是最早尝试的以补充丢失神经元为治疗策略的研究方向。已有研究发现, 人和小鼠源的骨髓来源的间充质干细胞 (bone marrow-derived stromal mesenchymal stem cells, BMSCs) 可在体外、体内分化, 重编程为神经元^[77-78], 人与小鼠源的成纤维细胞等体细胞经诱导多能干细胞 (induced pluripotent stem cells, iPSCs) 状态重编程为神经干/祖细胞后并最终分化为功能性神经元^[79-82]。虽然这些研究成果, 均为疾病状态下神经元再生的治疗策略奠定了基础^[83], 但体外重编程耗时长而移植窗口短, 体内重编程难以实现, 同时诱导多能干细胞向神经元的分化存在效率低、整合难、易癌变和高免疫原性等问题, 极大地降低了其临床转化性^[84-87]。

目前, 使用星形胶质细胞、小胶质细胞、NG2 胶质细胞等神经胶质细胞, 在离体或在体模型上向神经元的转分化, 均已取得一定的研究进展, 也是目前神经再生领域的热门话题。就目前的研究进展而言, 胶质细胞存在实现在体、原位、安全转分化为神经元的可能, 一旦实现稳定高效的神经胶质细胞-神经元转分化, 将为神经系统疾病的治疗带来新的希望。

星形胶质细胞和 NG2 胶质细胞是神经外胚层谱系分化而来的神经胶质细胞, 研究者们已成功利用多种手段将其诱导为新生神经元, 整合到现有的神经元回路中在体内形成正确连接, 并在一些突出的神经系统疾病 (包括 PD、AD 和 HD) 的小鼠模型上, 实现了基于星形胶质细胞/NG2 胶质细胞转分化神经元再生的可行性。与此同时, 研究者们对在星形胶质细胞内过表达 NeuroD1 或敲减 Ptp1 等部分转录因子的编辑, 是否具备介导转分化的功能、对现有研究在实验设计的合理性与逻辑性等问题存疑, 因此通过操纵 NeuroD1 和 Ptp1 的表达, 进而诱导胶质细胞向神经元转分化的可行性仍在探讨。

值得思考的是, 在转分化的诱导过程中, 使用病毒载体插入整合的手段进行转录因子的过表达或敲减, 不仅存在很大的不确定性 (如病毒携带基因插入方向不定、基因可能存在串联、病毒可能发生泄漏等), 也可能存在巨大的安全风险 (载体基因

组整合入人类基因组易致瘤等)^[87-88]。以上问题, 为科学研究结果结论是否精准与可重复, 以及临床应用是否靶向与安全带来隐患。因此, 如更改转录因子的递送手段, 改用细胞因子或化合物以纳米材料为载体进行定向投递等手段取代基因治疗途径, 改变胶质细胞表达谱, 将其诱导为神经元, 或许能增加解决目前在安全性和伦理上遇到的瓶颈问题。

另外, 现有研究多使用标志物共表达的实验判定新生神经元的来源, 但受限于现存递送技术的高滴度依赖性与易发生泄漏等缺陷, 标志物共表达也许不再是证明神经元来源的最佳判断标准。因此, 使用并基于需求开发更加精准的技术, 验证新生神经元的来源是平息质疑与进行进一步探索的最优选择。谱系追踪, 是目前干细胞领域的“金标准”, 且目前中枢神经系统内全部胶质细胞种类都可以使用基于 Cre-loxP 系统的报告基因进行永久追踪, 因此使用谱系追踪等方式, 或许能够更加严谨的论证新生神经元的来源^[52]。目前, 星形胶质细胞/NG2 胶质细胞-神经元转分化中各因子的作用机制尚不完全明确, 且大多在非灵长动物和体外培养的人胶质细胞内实践, 因此, 在这一领域中, 以下问题亟待进一步探索: a. 安全高效的因子递送手段的开发; b. 胶质细胞成功转分化为神经元的判定标准的确立; c. 诱导因子在转分化过程中作用机制的探索; d. 在灵长动物和人脑中重复结论。

相对于与神经元同谱系的两种胶质细胞, 小胶质细胞向神经元转分化则道阻且长。尽管有研究提出小胶质细胞向神经元转分化的可能, 但针对小胶质细胞向神经元转分化的理论与实验证据都显得较为匮乏, 只有严谨明确的谱系追踪、设计合理的对照组、明确的活体/活细胞成像证据与杀死该细胞后转分化现象的消失, 才能证明胶质细胞-神经元转分化现象的真实存在^[68]。目前, 小胶质细胞能够通过某种诱导转分化为神经元的论断仍未得到公认。未来应设计更加严谨合理的研究思路, 通过更加科学准确的技术手段, 获取更加翔实确凿的实验证据, 以确定小胶质细胞-神经元转分化的可能性。

总而言之, 胶质细胞-神经元转分化的研究正迅速发展, 并已经取得一系列显著的成果。尽管目前针对一些研究存在部分质疑, 但讨论与质疑是推动科学发展的原动力, 相信在未来这一领域的面纱终将揭开, 胶质细胞-神经元转分化的研究也终将为中心神经系统疾病的患者带来福音。

参 考 文 献

- [1] Miyata T, Kawaguchi D, Kawaguchi A, *et al.* Mechanisms that regulate the number of neurons during mouse neocortical development. *Curr Opin Neurobiol*, 2010, **20**(1): 22-28
- [2] Gage F H. Adult neurogenesis in mammals. *Science*, 2019, **364**(6443): 827-828
- [3] Miyazaki I, Asanuma M. Neuron-astrocyte interactions in Parkinson's disease. *Cells*, 2020, **9**(12): 2623
- [4] Giannakopoulos P, Herrmann F R, Bussiere T, *et al.* Tangle and neuron numbers, but not amyloid load, predict cognitive status in Alzheimer's disease. *Neurology*, 2003, **60**(9): 1495-1500
- [5] El-Koussy M, Schroth G, Brekenfeld C, *et al.* Imaging of acute ischemic stroke. *Eur Neurol*, 2014, **72**(5-6): 309-316
- [6] Masuda T, Amann L, Monaco G, *et al.* Specification of CNS macrophage subsets occurs postnatally in defined niches. *Nature*, 2022, **604**(7907): 740-748
- [7] Allen N J, Barres B A. Neuroscience: glia - more than just brain glue. *Nature*, 2009, **457**(7230): 675-677
- [8] Bruttger J, Karram K, Wortge S, *et al.* Genetic cell ablation reveals clusters of local self-renewing microglia in the mammalian central nervous system. *Immunity*, 2015, **43**(1): 92-106
- [9] Allen N J, Lyons D A. Glia as architects of central nervous system formation and function. *Science*, 2018, **362**(6411): 181-185
- [10] Brandao M, Simon T, Critchley G, *et al.* Astrocytes, the rising stars of the glioblastoma microenvironment. *Glia*, 2019, **67**(5): 779-790
- [11] Sofroniew M V. Astrocyte reactivity: subtypes, states, and functions in CNS innate immunity. *Trends Immunol*, 2020, **41**(9): 758-770
- [12] Nishiyama A, Boshans L, Goncalves C M, *et al.* Lineage, fate, and fate potential of NG2-glia. *Brain Res*, 2016, **1638**(Pt B): 116-128
- [13] Dawson M R L, Polito A, Levine J M, *et al.* NG2-expressing glial progenitor cells: an abundant and widespread population of cycling cells in the adult rat CNS. *Mol Cell Neurosci*, 2003, **24**(2): 476-488
- [14] Duncan G J, Simkins T J, Emery B. Neuron-oligodendrocyte interactions in the structure and integrity of axons. *Front Cell Dev Biol*, 2021, **9**: 653101
- [15] Frost J L, Schafer D P. Microglia: architects of the developing nervous system. *Trends Cell Biol*, 2016, **26**(8): 587-597
- [16] Prinz M, Jung S, Priller J. Microglia biology: one century of evolving concepts. *Cell*, 2019, **179**(2): 292-311
- [17] Huang Y, Xu Z, Xiong S, *et al.* Repopulated microglia are solely derived from the proliferation of residual microglia after acute depletion. *Nat Neurosci*, 2018, **21**(4): 530-540
- [18] Bi Q, Wang C, Cheng G, *et al.* Microglia-derived PDGFB promotes neuronal potassium currents to suppress basal sympathetic tonic activity and limit hypertension. *Immunity*, 2022, **55**(8): 1466-1482.e1469
- [19] Yang N, Ng Y H, Pang Z P, *et al.* Induced neuronal cells: how to make and define a neuron. *Cell Stem Cell*, 2011, **9**(6): 517-525
- [20] Wang F, Cheng L, Zhang X. Reprogramming glial cells into functional neurons for neuro-regeneration: challenges and promise. *Neurosci Bull*, 2021, **37**(11): 1625-1636
- [21] Cieslar-Pobuda A, Knoflach V, Ringh M V, *et al.* Transdifferentiation and reprogramming: overview of the processes, their similarities and differences. *Biochim Biophys Acta Mol Cell Res*, 2017, **1864**(7): 1359-1369
- [22] Buffo A, Rite I, Tripathi P, *et al.* Origin and progeny of reactive gliosis: a source of multipotent cells in the injured brain. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2008, **105**(9): 3581-3586
- [23] Sofroniew M V. Molecular dissection of reactive astrogliosis and glial scar formation. *Trends Neurosci*, 2009, **32**(12): 638-647
- [24] Pesaresi M, Sebastian-Perez R, Cosma M P. Dedifferentiation, transdifferentiation and cell fusion: *in vivo* reprogramming strategies for regenerative medicine. *FEBS J*, 2019, **286**(6): 1074-1093
- [25] Lang B, Liu H L, Liu R, *et al.* Astrocytes in injured adult rat spinal cord may acquire the potential of neural stem cells. *Neuroscience*, 2004, **128**(4): 775-783
- [26] Heins N, Malatesta P, Cecconi F, *et al.* Glial cells generate neurons: the role of the transcription factor Pax6. *Nat Neurosci*, 2002, **5**(4): 308-315
- [27] Buffo A, Vosko M R, Erturk D, *et al.* Expression pattern of the transcription factor Olig2 in response to brain injuries: implications for neuronal repair. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2005, **102**(50): 18183-18188
- [28] Ma Y C, Song M R, Park J P, *et al.* Regulation of motor neuron specification by phosphorylation of neurogenin 2. *Neuron*, 2008, **58**(1): 65-77
- [29] Tang B L. The potential of targeting brain pathology with Ascl1/Mash1. *Cells*, 2017, **6**(3): 26
- [30] Cobos I, Borello U, Rubenstein J L. Dlx transcription factors promote migration through repression of axon and dendrite growth. *Neuron*, 2007, **54**(6): 873-888
- [31] Cho J H, Tsai M J. The role of BETA2/NeuroD1 in the development of the nervous system. *Mol Neurobiol*, 2004, **30**(1): 35-47
- [32] Gtz M, Stoykova A, Gruss P. Pax6 controls radial glia differentiation in the cerebral cortex. *Neuron*, 1998, **21**(5): 1031-1044
- [33] Hack M A, Saghatelian A, De Chevigny A, *et al.* Neuronal fate determinants of adult olfactory bulb neurogenesis. *Nat Neurosci*, 2005, **8**(7): 865-872
- [34] Zhou Q, Anderson D J. The bHLH transcription factors OLIG2 and OLIG1 couple neuronal and glial subtype specification. *Cell*, 2002, **109**(1): 61-73
- [35] Berninger B, Costa M R, Koch U, *et al.* Functional properties of neurons derived from *in vitro* reprogrammed postnatal astroglia. *J Neurosci*, 2007, **27**(32): 8654-8664
- [36] Heinrich C, Blum R, Gascn S, *et al.* Directing astroglia from the cerebral cortex into subtype specific functional neurons. *PLoS Biol*, 2010, **8**(5): e1000373
- [37] Addis R C, Hsu F C, Wright R L, *et al.* Efficient conversion of

- astrocytes to functional midbrain dopaminergic neurons using a single polycistronic vector. *PLoS One*, 2011, **6**(12): e28719
- [38] Li H J, Ray S K, Pan N, *et al.* Intestinal NeuroD1 expression impairs paneth cell differentiation and promotes enteroendocrine lineage specification. *Sci Rep*, 2019, **9**(1): 19489
- [39] Chen Y C, Ma N X, Pei Z F, *et al.* A NeuroD1 AAV-based gene therapy for functional brain repair after ischemic injury through *in vivo* astrocyte-to-neuron conversion. *Mol Ther*, 2020, **28**(1): 217-234
- [40] Cho J H, Tsai M J. The role of BETA2/NeuroD1 in the development of the nervous system. *Mol Neurobiol*, 2004, **30**(1): 35-47
- [41] Kuwabara T, Hsieh J, Muotri A, *et al.* Wnt-mediated activation of NeuroD1 and retro-elements during adult neurogenesis. *Nat Neurosci*, 2009, **12**(9): 1097-1105
- [42] Gao Z, Ure K, Ables J L, *et al.* NeuroD1 is essential for the survival and maturation of adult-born neurons. *Nat Neurosci*, 2009, **12**(9): 1090-1092
- [43] Boutin C, Hardt O, De Chevigny A, *et al.* NeuroD1 induces terminal neuronal differentiation in olfactory neurogenesis. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2010, **107**(3): 1201-1206
- [44] Guo Z, Zhang L, Wu Z, *et al.* *In vivo* direct reprogramming of reactive glial cells into functional neurons after brain injury and in an Alzheimer's disease model. *Cell Stem Cell*, 2014, **14**(2): 188-202
- [45] Brulet R, Matsuda T, Zhang L, *et al.* NEUROD1 instructs neuronal conversion in non-reactive astrocytes. *Stem Cell Rep*, 2017, **8**(6): 1506-1515
- [46] Ge L J, Yang F H, Li W, *et al.* *In vivo* neuroregeneration to treat ischemic stroke through NeuroD1 AAV-based gene therapy in adult non-human primates. *Front Cell Dev Biol*, 2020, **8**: 590008
- [47] Wu Z, Parry M, Hou X Y, *et al.* Gene therapy conversion of striatal astrocytes into GABAergic neurons in mouse models of Huntington's disease. *Nat Commun*, 2020, **11**(1): 1105
- [48] Puls B, Ding Y, Zhang F, *et al.* Regeneration of functional neurons after spinal cord injury *via in situ* NeuroD1-mediated astrocyte-to-neuron conversion. *Front Cell Dev Biol*, 2020, **8**: 591883
- [49] Boison D, Steinhäuser C. Epilepsy and astrocyte energy metabolism. *Glia*, 2018, **66**(6): 1235-1243
- [50] Zheng J, Li T, Qi S, *et al.* Neuroregenerative gene therapy to treat temporal lobe epilepsy in a rat model. *Prog Neurobiol*, 2022, **208**: 102198
- [51] Wang X, Pei Z, Hossain A, *et al.* Transcription factor-based gene therapy to treat glioblastoma through direct neuronal conversion. *Cancer Biol Med*, 2021, **18**(3): 860-874
- [52] Wang L L, Zhang C L. *In vivo* glia-to-neuron conversion: pitfalls and solutions. *Dev Neurobiol*, 2022, **82**(5): 367-374
- [53] Wang L L, Serrano C, Zhong X, *et al.* Revisiting astrocyte to neuron conversion with lineage tracing *in vivo*. *Cell*, 2021, **184**(21): 5465-5481.e5416
- [54] Ma N X, Puls B, Chen G. Transcriptomic analyses of NeuroD1-mediated astrocyte-to-neuron conversion. *Dev Neurobiol*, 2022, **82**(5): 375-391
- [55] Xu L, Xiang Z Q, Guo Y W, *et al.* Enhancing NeuroD1 expression to convert lineage-traced astrocytes into neurons. *bioRxiv*, 2022. <https://doi.org/10.1101/2022.06.21.496971>
- [56] Xiang Z, Xu L, Liu M, *et al.* Lineage tracing of direct astrocyte-to-neuron conversion in the mouse cortex. *Neural Regen Res*, 2021, **16**(4): 750-756
- [57] Makeyev E V, Zhang J, Carrasco M A, *et al.* The microRNA miR-124 promotes neuronal differentiation by triggering brain-specific alternative pre-mRNA splicing. *Mol Cell*, 2007, **27**(3): 435-448
- [58] Xue Y, Ouyang K, Huang J, *et al.* Direct conversion of fibroblasts to neurons by reprogramming PTB-regulated microRNA circuits. *Cell*, 2013, **152**(1-2): 82-96
- [59] Qian H, Kang X, Hu J, *et al.* Reversing a model of Parkinson's disease with *in situ* converted nigral neurons. *Nature*, 2020, **582**(7813): 550-556
- [60] Zhou H, Su J, Hu X, *et al.* Glia-to-neuron conversion by CRISPR-CasRx alleviates symptoms of neurological disease in mice. *Cell*, 2020, **181**(3): 590-603.e516
- [61] Maimon R, Chillon-Marin C, Snethlage C E, *et al.* Therapeutically viable generation of neurons with antisense oligonucleotide suppression of PTB. *Nat Neurosci*, 2021, **24**(8): 1089-1099
- [62] Xie Y, Zhou J, Chen B. Critical examination of Ptbp1-mediated glia-to-neuron conversion in the mouse retina. *Cell Rep*, 2022, **39**(11): 110960
- [63] Chen W, Zheng Q, Huang Q, *et al.* Repressing PTBP1 fails to convert reactive astrocytes to dopaminergic neurons in a 6-hydroxydopamine mouse model of Parkinson's disease. *eLife*, 2022, **11**: e75636
- [64] Hoang T, Kim D W, Appel H, *et al.* Genetic loss of function of Ptbp1 does not induce glia-to-neuron conversion in retina. *Cell Rep*, 2022, **39**(11): 110849
- [65] Blackshaw S, Sanes J R. Turning lead into gold: reprogramming retinal cells to cure blindness. *J Clin Invest*, 2021, **131**(3): e146134
- [66] Cooper A, Berninger B. Gatekeeping astrocyte identity. *eLife*, 2022, **11**: e80232
- [67] Borges K, McDermott D, Irier H, *et al.* Degeneration and proliferation of astrocytes in the mouse dentate gyrus after pilocarpine-induced status epilepticus. *Exp Neurol*, 2006, **201**(2): 416-427
- [68] Rao Y, Du S, Yang B, *et al.* NeuroD1 induces microglial apoptosis and cannot induce microglia-to-neuron cross-lineage reprogramming. *Neuron*, 2021, **109**(24): 4094-4108.e4095
- [69] Matsuda T, Irie T, Katsurabayashi S, *et al.* Pioneer factor NeuroD1 rearranges transcriptional and epigenetic profiles to execute microglia-neuron conversion. *Neuron*, 2019, **101**(3): 472-485.e477
- [70] Kriegstein A, Alvarez-Buylla A. The glial nature of embryonic and adult neural stem cells. *Ann Rev Neurosci*, 2009, **32**: 149-184
- [71] Dimou L, Götz M. Glial cells as progenitors and stem cells: new roles in the healthy and diseased brain. *Physiol Rev*, 2014, **94**(3):

- 709-737
- [72] Pevny L H, Nicolis S K. Sox2 roles in neural stem cells. *Int J Biochem Cell Biol*, 2010, **42**(3): 421-424
- [73] Heinrich C, Bergami M, Gascón S, *et al.* Sox2-mediated conversion of NG2 glia into induced neurons in the injured adult cerebral cortex. *Stem Cell Rep*, 2014, **3**(6): 1000-1014
- [74] Tai W, Wu W, Wang L L, *et al.* *In vivo* reprogramming of NG2 glia enables adult neurogenesis and functional recovery following spinal cord injury. *Cell Stem Cell*, 2021, **28**(5): 923-937.e924
- [75] Torper O, Ottosson D R, Pereira M, *et al.* *In vivo* reprogramming of striatal NG2 glia into functional neurons that integrate into local host circuitry. *Cell Rep*, 2015, **12**(3): 474-481
- [76] Weinberg M S, Criswell H E, Powell S K, *et al.* Viral vector reprogramming of adult resident striatal oligodendrocytes into functional neurons. *Mol Ther*, 2017, **25**(4): 928-934
- [77] Brazelton T R, Rossi F M, Keshet G I, *et al.* From marrow to brain: expression of neuronal phenotypes in adult mice. *Science*, 2000, **290**(5497): 1775-1779
- [78] Chen Y, Teng F Y H, Tang B L. Coaxing bone marrow stromal mesenchymal stem cells towards neuronal differentiation: progress and uncertainties. *Cell Mol Life Sci*, 2006, **63**(14): 1649-1657
- [79] Vierbuchen T, Ostermeier A, Pang Z P, *et al.* Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. *Nature*, 2010, **463**(7284): 1035-1041
- [80] Colasante G, Lignani G, Rubio A, *et al.* Rapid conversion of fibroblasts into functional forebrain GABAergic interneurons by direct genetic reprogramming. *Cell Stem Cell*, 2015, **17**(6): 719-734
- [81] Niu W, Zang T, Zou Y, *et al.* *In vivo* reprogramming of astrocytes to neuroblasts in the adult brain. *Nat Cell Biol*, 2013, **15**(10): 1164-1175
- [82] Torper O, Pfisterer U, Wolf D A, *et al.* Generation of induced neurons *via* direct conversion *in vivo*. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2013, **110**(17): 7038-7043
- [83] 王媛媛, 鲍晓明, 凌云翔, 等. 诱导多功能干细胞治疗阿尔茨海默病的研究进展. *生物化学与生物物理进展*, 2018, **45**(6): 637-643
- Wang Y Y, Bao X M, Ling Y X, *et al.* *Prog Biochem Biophys*, 2018, **45**(6): 637-643
- [84] Qin H, Zhao A, Fu X. Small molecules for reprogramming and transdifferentiation. *Cell Mol Life Sci*, 2017, **74**(19): 3553-3575
- [85] Mccaughey-Chapman A, Connor B. Human cortical neuron generation using cell reprogramming: a review of recent advances. *Stem Cells Dev*, 2018, **27**(24): 1674-1692
- [86] Su Z, Niu W, Liu M L, *et al.* *In vivo* conversion of astrocytes to neurons in the injured adult spinal cord. *Nat Commun*, 2014, **5**: 3338
- [87] Okita K, Ichisaka T, Yamanaka S. Generation of germline-competent induced pluripotent stem cells. *Nature*, 2007, **448**(7151): 313-317
- [88] Lu J, Liu H, Huang C T, *et al.* Generation of integration-free and region-specific neural progenitors from primate fibroblasts. *Cell Rep*, 2013, **3**(5): 1580-1591

Research Progress in The Glia-to-neuron Conversion

ZHAO Xiao-Chu¹⁾, LUO Zhao-Li²⁾, YANG Fei³⁾, LI Qian^{2)*}

¹⁾School of Basic Medical Sciences, Capital Medical University, Beijing 100069, China;

²⁾Department of Molecular Biology and Biochemistry, School of Basic Medical Sciences, Capital Medical University, Beijing 100069, China;

³⁾Department of Neurobiology, School of Basic Medical Sciences, Capital Medical University, Beijing 100069, China)

Graphical abstract

Abstract Cellular conversion is a process of genetic reprogramming by various methods to induce the direct transformation of one type of cell into another without going through other intermediate states. Neuronal loss is a common pathological process in a variety of neurological disorders, including Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and stroke. Neuronal loss is usually irreversible and causes motor, sensory, and psychiatric symptoms. Since the human central nervous system has limited capacity for neuronal regeneration, therapeutic strategies that use glial cells (astrocytes, microglia, and oligodendrocyte precursor cells) to transdifferentiate into functional neurons *in situ* of neuronal loss and integrate them into neural networks have received much attention. In recent years, successful conversion of glia-to-neuron by manipulating the gene expression of key transcription factors in neuronal fate determination in glial cells has been discovered. Nevertheless, there is still some controversy about the scientific validity of some research technologies, the rationality of judgment criteria, and the self-consistency between experimental results and conclusions. This article reviews the discovery and development of glia-to-neuron conversion and takes astrocytes, microglia, and oligodendrocyte progenitor cells as examples to summarize the important findings of glia-to-neuron conversion with discussion and perspective.

Key words glia, neuron, cellular conversion, neural regeneration, neuronal repair

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0459

* Corresponding author.

Tel: 86-10-83950515, E-mail: qianli@ccmu.edu.cn

Received: September 24, 2022 Accepted: October 11, 2022