第五版《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》下成人胶质瘤诊断及预后*

郑淑荣 庞波 柴睿超**

(北京市神经外科研究所, 北京 100070)

摘要 目的 脑胶质瘤是最常见的恶性原发性中枢神经系统肿瘤, 近年来分子病理的快速发展对胶质瘤诊断及分级带来了重要影响, 在2021年发布的《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》(第五版) 引入了更多分子指标对肿瘤的诊断和分级进行指导。本研究旨在临床队列中比较最新版指南和上一版指南对肿瘤诊断及预后评估的影响, 以期为临床实践活动中新版指南的应用提供数据参考和依据。**方法** 回顾性纳入了癌症基因组图谱数据库512例胶质瘤样本, 分别依据2016版和2021版《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》进行诊断、通过Kaplan-Meier进行生存曲线绘制和中位总生存期计算和生存差异分析。**结果** 对512例样本分别完成了上一版指南和最新版指南的诊断及分级。在新版指南下分别有53和72例异柠檬酸脱氢酶(IDH)突变型和IDH野生型的胶质瘤诊断级别升级为了4级, 且这些诊断级别升高的胶质瘤的预后更差。**结论** 最新版指南较上一版指南可对胶质瘤进行更为精准地分类及分级, 在有条件的情况下应尽快依据最新版指南开展诊断及分级。

关键词 胶质瘤, 分子病理, 世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南, 生存分析

中图分类号 R73

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0306

胶质瘤是常见的恶性原发性颅内肿瘤, 约占颅内所有肿瘤的80%^[1]。近年来, 分子病理的快速发展使得人们可以更为精准地对胶质瘤进行分类。因此, 2021年发布的第五版《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》(简称为: WHO2021版), 在组织学诊断的基础上, 纳入了更多的分子指标来指导胶质瘤的分类和分级^[2]。对于胶质瘤恶性度级别的诊断, 新版指南建议以阿拉伯数字(1~4)取代原来的罗马数字(I~IV)。鉴于WHO2021版指南纳入了更多的分子指标, 且分类框架也发生了调整, 原本依据2016年发布的《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》(简称为: WHO2016版)恶性级别诊断为II/III级胶质瘤, 其WHO2021版诊断的最终分类和恶性级别均会发生调整^[1-2]。但更多分子指标的加入也对临床应用新版指南带来了一定挑战, 很多单位目前尚无法依据新版指南对胶质瘤进行诊断及分级, 目前仍在依据上一版的指南对胶质瘤进行分类和分级^[3]。因而, 在临床队列中直接比较最新版指南和上一版指南对胶质瘤诊

断和分级的差异, 并对这些差异病例的预后等临床特征进行分析显得尤为必要。本研究应用癌症基因组图谱(The Cancer Genome Atlas, TCGA)数据库, 系统比较了512例WHO 2016版诊断为II/III级的胶质瘤的WHO2016版诊断和WHO2021版诊断差异, 并对两版指南中恶性度级别发生变化的成人型胶质瘤的预后进行了解析, 以期为临床实践活动中新版指南的应用提供数据参考和依据。

1 材料与方法

1.1 病例资料收集

回顾性纳入了TCGA数据库中组织学诊断为II/III级, 且拥有IDH突变状态和染色体1p/19q联合缺失状态信息的512例胶质瘤。同步收集了这些样本的CDKN2A纯合缺失、TERT启动区突变、

* 北京市科技新星计划(Z201100006820118)资助项目。

** 通讯联系人。

Tel: 010-59975624, E-mail: chairuichao_glia@163.com

收稿日期: 2022-06-28, 接受日期: 2022-08-03

EGFR 扩增、染色体 7p 扩增、染色体 7q 扩增、染色体 10p 缺失、染色体 10q 缺失, 及对应患者的总生存期等信息。

1.2 WHO2016版诊断

依据 2016 年发布的《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》, 结合组织学诊断、*IDH* 突变和染色体 1p/19q 联合缺失状态定义了样本的 WHO2016 版诊断; 包括 137 例弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, II 级; 113 例间变性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, III 级; 21 例弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 野生型, II 级; 73 例间变性星形细胞瘤, *IDH* 野生型, III 级; 94 例少突胶质细胞瘤, *IDH* 突变伴 1p/19q 联合缺失型, II 级; 74 例间变性少突胶质细胞瘤, *IDH* 突变伴 1p/19q 联合缺失型, III 级 (图 1a)。

1.3 WHO2021版诊断

依据 2021 年发布的第五版《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》, 通过组织学诊断、结合 *IDH* 突变、染色体 1p/19q 联合缺失、*CDKN2A* 纯合缺失、*TERT* 启动区突变、*EGFR* 扩增、染色体 7p 扩增、染色体 7q 扩增、染色体 10p 缺失及染色体 10q 缺失状态, 对 512 例样本进行 WHO2021 版诊断。

1.4 统计分析

采用 Graphpad prism8.0 软件进行 Kaplan-Meier 进行生存曲线绘制, 并进行了中位总生存期计算和生存差异分析, 通过使用 Log-rank 进行生存差异的分析, $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 WHO2016 版诊断为 II/III 级胶质瘤的 WHO2021 版诊断

首先, 本文详细地比较了 512 例入组样本的 WHO2016 版诊断和 WHO2021 版诊断, 它们的 *CDKN2A* 纯合缺失、*TERT* 启动区突变、*EGFR* 扩增、染色体 7p 扩增、染色体 7q 扩增、染色体 10p 缺失及染色体 10q 缺失状态 (图 1a)。结果显示, 512 例样本中 362 例样本的级别诊断没有发生变化, 125 例样本的级别在 WHO2021 版中被诊断为 4 级, 这些样本至少携带了 *CDKN2A* 纯合缺失、*TERT* 启动区突变、*EGFR* 扩增、染色体 7 号获得联合 10 号缺失中的一项, 25 例样本由于缺乏足够的分子指标在 WHO2021 版的指南中难以给出级别诊断。

随后进一步详细解析了这些样本的 WHO2016

版诊断和 WHO2021 版诊断的对应关系 (图 1b)。结果显示, 所有少突胶质瘤细胞瘤的诊断分级均未发生变化。在 *IDH* 突变的星形细胞瘤中, 113 例和 81 例 WHO2016 版诊断分别为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, II 级”和“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, III 级”的样本, WHO2021 版诊断分别为“星形细胞瘤、*IDH* 突变型, 2 级”和“星形细胞瘤、*IDH* 突变型, 3 级”; 21 例 WHO2016 版诊断为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, II 级”的样本, WHO2021 版诊断为“星形细胞瘤、*IDH* 突变型, 4 级”; 32 例 WHO2016 版诊断为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, III 级”的样本, WHO2021 版诊断为“星形细胞瘤、*IDH* 突变型, 4 级”; 3 例 WHO2016 版诊断分别为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 突变型, II 级”和样本由于缺乏 *CDKN2A* 拷贝数变异的信息, 其 WHO2021 版诊断为“星形细胞瘤、*IDH* 突变型, NOS”, 不能明确其潜在级别。

所有 WHO2016 版诊断为 II/III 级的 *IDH* 野生型的样本, WHO2021 版诊断均发生了大的变化, 其中 10 例 WHO2016 版诊断为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 野生, II 级”的样本, WHO2021 版诊断为“胶质母细胞瘤、*IDH* 野生型, 4 级”; 62 例 WHO2016 版诊断为“弥漫性星形细胞瘤, *IDH* 野生, III 级”的样本, WHO2021 版诊断为“胶质母细胞瘤、*IDH* 野生型, 4 级”; 22 例样本由于缺乏足够的分子信息不能给出明确的 WHO2021 版诊断。

2.2 WHO2021 版诊断对 WHO2016 版诊断为 II/III 级胶质瘤的预后影响

鉴于 WHO2016 版诊断为 II/III 级的 *IDH* 突变型和野生型中都存在部分胶质瘤在 WHO2021 版诊断中会升级为 4 级。本文系统分析了 WHO2021 版诊断对 WHO2016 版诊断为 II/III 级胶质瘤的预后影响。

在 WHO2016 版诊断为 II/III 级的 247 例 *IDH* 突变型中, 分别有 113 例、81 例、53 例样本被诊断为星形细胞瘤, *IDH* 突变型的 2、3、4 级, 且它们的预后间存在显著的差异 (图 2a)。其中, 4 级肿瘤的生存显著比 2 级 ($P < 0.0001$) 和 3 级 ($P = 0.0114$) 差, 而 3 级肿瘤的生存呈现出比 2 级的胶质瘤更差的趋势 ($P = 0.0665$)。在 WHO2016 版诊断中为 II 级的肿瘤中, WHO2021 版诊断为 4 级的 21 例样本的生存显著差于诊断为 2 级的 113 例肿瘤 ($P = 0.00112$, 图 2b)。WHO2016 版诊断中为 III 级的肿

Fig. 1 The diagnosis and molecular features of cases used in this study

(a) The WHO 2016 classification (WHO2016), WHO 2021 classification (WHO2021), and key molecular features of all cases. (b) The correspondence between WHO2016 and WHO2021.

瘤中，WHO2021版诊断为4级的32例样本的生存显著差于诊断为3级的81例肿瘤 ($P=0.0044$, 图2c)。

在WHO2016版诊断为II/III级的94例*IDH*野生型胶质瘤中，发现72例在WHO2021版诊断中会升级胶质母细胞瘤，*IDH*野生型，4级的肿瘤预后显著差于其余22例未能完成明确诊断的肿瘤 ($P=$

0.0074, 图3a)。在WHO2016版诊断中为II级的肿瘤中，WHO2021版诊断为4级胶质母细胞瘤的10例样本的生存较诊断未明确的11例肿瘤生存呈现出更差的趋势，但是差异不显著 ($P=0.3472$, 图3b)。WHO2016版诊断中为III级的肿瘤中，WHO2021版诊断为4级的62例样本的生存显著差于诊断未明确的11例肿瘤 ($P=0.0153$, 图3c)。

Fig. 2 The impact of WHO2021 on the prognosis of IDH-mutant gliomas

(a) The prognosis of IDH-mutant gliomas stratified by the grade of WHO2021. (b) The prognosis of IDH-mutant whose grade II gliomas are stratified by the grade of WHO2021. (c) The prognosis of IDH-mutant whose grade III gliomas are stratified by the grade of WHO2021. The P values were calculated by Log-rank test.

Fig. 3 The impact of WHO2021 in the prognosis of IDH-wildtype gliomas

(a) The prognosis of IDH-wildtype gliomas stratified by the grade of WHO2021. (b) The prognosis of IDH-wildtype WHO grade II gliomas stratified by the grade of WHO2021. (c) The prognosis of IDH-wildtype WHO grade III gliomas stratified by the grade of WHO2021. The P values were calculated by Log-rank test.

3 讨 论

目前,弥漫性胶质瘤即使经过手术、放疗或化疗、肿瘤电场治疗等综合治疗,预后仍不佳。超过60%的弥漫性胶质瘤为胶质母细胞瘤,这种恶性程度最高的中枢神经系统肿瘤的平均总生存期约为14~16个月^[2, 4-6]。在过去的15年里,胶质瘤预后的改善非常有限,这在很大程度上归因于胶质瘤独特的解剖位置、生物学特征、发育、遗传、表观遗传学和微环境特征使它们对传统和新治疗产生耐药性^[6-8]。改善胶质瘤的治疗效果很大程度上依赖于对胶质瘤进行精准诊断和分型,然而,传统仅根据组织学特征对弥漫性胶质瘤进行的分类,也无法为临床医生提供足够的信息来针对性对患者制定个性化的管理方案^[1, 9-10]。近年来,分子病理的快速发展给弥漫性胶质瘤的精准诊断带来了希望。本研究明确了从2016版的《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》到2021版的《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类指南》,随着越来越多分子指标的纳入胶质瘤诊断的变化情况。

依据2021年的新版指南和专家共识, *IDH*野生型星形细胞瘤如果伴有EGFR扩增、染色体7号获得/10号缺失或者TERT启动子突变(胶质母细胞瘤的典型分子特征),即使缺乏坏死和/或微血管增生,也诊断为“胶质母细胞瘤, *IDH*野生型, WHO 4级”;而 *IDH*突变型胶质瘤,在缺乏坏死和/或微血管增生的情况下,如果携带CDKN2A/B纯合性缺失,也需被诊断为“星形细胞瘤, *IDH*突变型, WHO 4级”^[2, 11-12]。为了更好地明确最新版WHO指南对胶质瘤诊断、预后分层地影响,本研究系统地对512例2016版诊断为II/III级胶质瘤进行了2021版诊断,并通过一一对应分析,对这些病例的诊断变化情况进行了详细阐述,结果表明部分2016版诊断为II/III级的胶质瘤在2021版诊断中会升级为4级,提示这部分胶质瘤后续的治疗和临床管理均应按照4级胶质瘤来开展,凸显了新版指南的临床价值和意义。

肿瘤的诊断分级应该对其预后评估起到指导作用,考虑到4级胶质瘤的预后会更差^[7, 13],本研究还重点关注了在2021版诊断中级别升高的胶质瘤的预后情况。结果表明,在2021版诊断级别升级为4级的胶质瘤患者的预后确实显著变差,该结果表明2021版诊断可较2016版诊断进一步对患者的预后进行分层。与此同时,在WHO2016版诊断为

II级的 *IDH*野生型星形细胞瘤中,WHO2021版诊断级别是否升高未能起到对预后显著分层的效果。导致该结果潜在因素包括多个方面:首先,这组样本的数量相对较少可能导致了统计学差异不显著;其次,当前组织学级别对肿瘤的预后影响尚不能完全排除,近期的其他研究成果也提示,在 *IDH*野生型胶质瘤中,仅依据分子指标诊断为4级但缺乏组织学4级特征的肿瘤预后要好于组织学诊断为4级的肿瘤^[14];最后,近期也有研究对TERT启动子区突变以外其他指标单独作为诊断4级依据的可靠性提出了质疑^[6]。这也提示仍需继续通过更多地队列分析及相关研究来明确该问题。

4 结 论

综上所述,本队列研究成果提示,WHO2021版诊断具有进一步分层WHO2016版诊断为II/III级胶质瘤的能力,在有条件的情况下应该尽快完成WHO2021版诊断来对胶质瘤进行精准分层,但对于WHO2016版诊断为II的 *IDH*野生型胶质瘤在WHO2021版诊断升级为4级的胶质瘤仍需进一步关注其确切生存。

参 考 文 献

- [1] Jiang T, Nam DH, Ram Z, *et al.* Clinical practice guidelines for the management of adult diffuse gliomas. *Cancer Lett*, 2021, **499**:60-72
- [2] Louis D N, Perry A, Wesseling P, *et al.* The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Neuro Oncol*, 2021, **23**(8): 1231-1251
- [3] Louis D N, Perry A, Reifenberger G, *et al.* The 2016 World Health Organization classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Acta Neuropathol*, 2016, **131**(6): 803-820
- [4] Wen PY, Packer R J. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: clinical implications. *Neuro Oncol*, 2021, **23**(8): 1215-1217
- [5] Jiang T, Mao Y, Ma W, *et al.* CGCG clinical practice guidelines for the management of adult diffuse gliomas. *Cancer Lett*, 2016, **375**(2): 263-273
- [6] Chai R C, Chang Y Z, Chang X, *et al.* YTHDF2 facilitates UBXN1 mRNA decay by recognizing METTL3-mediated m(6)A modification to activate NF-kappaB and promote the malignant progression of glioma. *J Hematol Oncol*, 2021, **14**(1): 109
- [7] Hu H, Mu Q, Bao Z, *et al.* Mutational landscape of secondary glioblastoma guides MET-targeted trial in brain tumor. *Cell*, 2018, **175**(6): 1665-1678 e1618
- [8] Neftel C, Laffy J, Filbin M G, *et al.* An integrative model of cellular states, plasticity, and genetics for glioblastoma. *Cell*, 2019, **178**(4): 835-849.e21

- [9] Wang Q, Hu B, Hu X, *et al.* Tumor evolution of glioma-intrinsic gene expression subtypes associates with immunological changes in the microenvironment. *Cancer Cell*, 2017, **32**(1): 42-56.e46
- [10] Ellison D W, Hawkins C, Jones D T W, *et al.* cIMPACT-NOW update 4: diffuse gliomas characterized by MYB, MYBL1, or FGFR1 alterations or BRAF(V600E) mutation. *Acta Neuropathol*, 2019, **137**(4): 683-687
- [11] Brat D J, Aldape K, Colman H, *et al.* cIMPACT-NOW update 3: recommended diagnostic criteria for "Diffuse astrocytic glioma, IDH-wildtype, with molecular features of glioblastoma, WHO grade IV". *Acta Neuropathol*, 2018, **136**(5): 805-810
- [12] Brat D J, Aldape K, Colman H, *et al.* cIMPACT-NOW update 5: recommended grading criteria and terminologies for IDH-mutant astrocytomas. *Acta Neuropathol*, 2020, **139**(3): 603-608
- [13] Wang J, Cazzato E, Ladewig E, *et al.* Clonal evolution of glioblastoma under therapy. *Nat Genet*, 2016, **48**(7): 768-776
- [14] Chang Y Z, Li G Z, Pang B, *et al.* Transcriptional characteristics of IDH-wild type glioma subgroups highlight the biological processes underlying heterogeneity of IDH-wild type WHO grade IV gliomas. *Front Cell Dev Biol*, 2020, **8**:580464

Diagnosis and Prognosis of Adult Glioma According to The Fifth Edition of *WHO Classification of Tumors of The Central Nervous System**

ZHENG Shu-Rong, PANG Bo, CHAI Rui-Chao**

(Beijing Neurosurgical Institute, Beijing 100070, China)

Abstract Objective Glioma is the most common malignant primary tumor of the central nervous system. Recently, the rapid development of molecular pathology has brought an important influence on the diagnosis and classification of gliomas. The latest version of the *World Health Organization (WHO) Classifications of The Central Nervous System Tumors* (fifth edition) published in 2021 has introduced more molecular features to guide the diagnosis and classification of gliomas. The aim of this study was to provide evidence of the application of the latest version of WHO classification *via* comparing the fluences of the latest and the previous version of WHO classifications on tumor diagnosis and prognosis in a clinical cohort. **Methods** 512 glioma samples were retrospectively included in the cancer genome atlas database. The diagnosis was performed according to the latest (2021 edition) and the previous version (2016 edition) of WHO classifications, respectively. Kaplan-Meier curves were used to calculate median overall survival and analyze survival differences. **Results** We completed the diagnosis and grading of 512 cases by the latest (2021 edition) and the previous version (2016 edition) of WHO classifications, respectively. 53 cases of IDH mutant tumors and 72 cases of IDH wildtype tumors were upgraded to grade 4 in the latest version (2021 edition) of the WHO classification. These tumors with elevated grades also had a worse prognosis. **Conclusion** Compared with the previous version, glioma can be classified and graded more accurately by the latest version (2021 edition) of the WHO classification. Diagnosis and grading should be performed according to the latest version as soon as possible.

Key words glioma, molecular pathology, WHO Classifications of The Central Nervous System Tumors, survival analysis

DOI: 10.16476/j.pibb.2022.0306

* This work was supported by a grant from the Beijing Nova Program (Z201100006820118).

** Corresponding author.

Tel: 86-10-59975624, E-mail: chairuichao_glia@163.com

Received: June 28, 2022 Accepted: August 3, 2022